AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-6-76216802

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »
(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex
Téléphone 92-42-68 · Postes 440 et 449

ABONNEMENT ANNUEL : 50,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A. Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 60 du 25 JUIN 1976.-

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.-

Le premier vol se poursuit et les conditions climatiques se maintiennent favorables à ce ravageur.

Il est conseillé d'effectuer un second traitement dans les premiers jours du mois de Juillet.

Etendre ce traitement aux Noyers.

Si nécessaire poursuivre la lutte contre l'Oïdium du Pommier, les Acariens, les Pucerons , les Psylles du Poirier.

CEREALES

PUCERONS DES CEREALES.-

En général le niveau des populations reste inférieur au seuil de nuisibilité. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir.

A noter que les blés ont atteint, dans la plupart des cas, le stade "grain pâteux", stade à partir duquel, on considère que les pucerons n'ont plus d'incidence économique sur la récolte.

Remarque concernant l'alimentation du bétail :

Dans le cas où des céréales traitées avec des insecticides devraient être consommées par le bétail, il conviendra de respecter un délai d'au moins trois semaines entre le date du traitement et celle d'utilisation afin d'éviter tout risque d'intoxication.

MAÏS

PYRALE DU MAÏS.-

Dans les zones où des dégâts ont été observés ces dernières années, il y aura lieu d'intervenir lorsque 50 % environ des panicules mâles seront visibles dans le cornet.

L'un des produits suivants peut être utilisé, sous forme de granulés : Bacillus thuringiensis, chlorpyriphos, fénitrothion, parathion, phoxime, tetrachlorvinphos.

P.1.4.29

Imprimerie de la Station Auvergne-Limousin — Directeur-Gérant : P. JOURNET.

V I G N E

OÏDIUM.-

Dans les endroits favorables à cette maladie il est important d'intervenir dès maintenant.

ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES.-

Les conditions climatiques actuelles favorisent l'activité de ces acariens et localement des attaques importantes peuvent être observées : intervenir s'il y a lieu.

Clermont-Ferrand, le 25 Juin 1976.

L'Ingenieur chargé des Avertissements Agricoles :

C.. TARDIEU.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie chargé d'assurer l'intérim de la direction de la Circonscription Phytosanitaire :

A. LECLERC.

N° d'inscription à la C. P. P. A. P. 525 AD